

Zu erlernende und beherrschende Medikamente wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind (NotSanG § 4 Abs. 2 Nr. 1 c)

Medikament	Indikationen (Erläuterungen, Einschränkungen)	Zeitkritisch? Folgeschäden	Lebens- rettend?	Applikations- form	für NotSan aufnehmen
Amiodaron	<ul style="list-style-type: none"> Reanimation primär Defibrillation erst nach ca. 6 Minuten erforderlich 	+++	+++	i.v.	i.v. JA
Atropinsulfat	<ul style="list-style-type: none"> symptomatische Bradykardie und kein AV-Block II⁰ oder III⁰, instabiler Patient erste Wahl, dann Pacer 	++	++	i.v.	i.v. JA
Diazepam	<ul style="list-style-type: none"> Sedierung 	+	+		NEIN
	<ul style="list-style-type: none"> Kindl. Fieberkrampf 	+++	+++	i.v. / rectal	rectal JA
	<ul style="list-style-type: none"> Status epilepticus Erwachsene 	+++	+++	i.v. / rectal	rectal JA (zweite Wahl)
Epinephrin	<ul style="list-style-type: none"> Reanimation 	+++	+++	i.v.	i.v. JA
	<ul style="list-style-type: none"> Anaphylaxie 	+++	+++	i.m.	i.m. JA
	<ul style="list-style-type: none"> Hypotension u. Schock (Ursachentherapie vorrangig!) 	+++	+	i.v.	NEIN
Epinephrin	<ul style="list-style-type: none"> Schwellung Atemwege Pseudo-Krupp 	+++	+++	inhalativ	inhalativ JA , sofern ein inhalativ zugelassenes Präparat zur Verfügung steht
Fentanyl	<ul style="list-style-type: none"> Starke Schmerzen 	++		i.v.	i.v. JA (siehe Schmerztherapie)
Flumazenil	<ul style="list-style-type: none"> Benzodiazepinüberdosierung oder -intoxikation 	+++	+++	i.v.	i.v. JA
Glukose	<ul style="list-style-type: none"> Hypoglykämie 	+++	+++	i.v.	i.v. JA
Lorazepam (Kühlung!)	<ul style="list-style-type: none"> Sedierung 	-	-	buccal/i.v.	NEIN
	<ul style="list-style-type: none"> Kindl. Fieberkrampf 	+++	+++	buccal/i.v.	NEIN
	<ul style="list-style-type: none"> Status epilepticus Kinder und Jugendliche 	+++	+++	buccal/i.v.	buccal Ja
	<ul style="list-style-type: none"> Status epilepticus Erwachsene 	+++	+++	buccal/i.v.	i.v. JA



Ausschuss Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

AG Empfehlungen zur Medikamentenvorhaltung auf Rettungsmitteln in Bayern

Medikament	Indikationen (Erläuterungen, Einschränkungen)		Zeitkritisch? Folgeschäden	Lebens- rettend?	Applikations- form	Für NotSan aufnehmen
Magnesiumsulfat	• Wehenhemmung		+	+	i.v.	NEIN
	• Torsade de Pointes mit kardiogenem Schock		+++	+++	i.v.	i.v. JA
Morphin	• Schmerzen, Vernichtungsschmerz		++		i.v.	i.v. JA (siehe Schmerztherapie)
Naloxon	• Opioidüberdosierung oder -intoxikation		+++	+++	i.v.	i.v. JA
Prednison	• Pseudo-Krupp		+++	++	supp / i.v.	rectal JA
Salbutamol	• Asthma bronchiale • COPD		+++	+++	inhalativ	inhalativ JA
Sauerstoff	• Hypoxämie		++	++		inhalativ JA
Kristalloide Infusionslösungen	• Volumenmangel		+++	+++	i.v.	i.v. JA

Empfehlung zur Therapie starker/stärkster Schmerzen für Notfallsanitäter bei folgenden Krankheitsbildern

<p>Vor jeglicher Schmerztherapie müssen die folgenden primären Maßnahmen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung • Schonung • Schienung • Kühlung • Empathie • Gesprächsführung etc. • NRS erheben! 	<p><u>Fentanyl bei Trauma, Verbrühung, Verbrennung:</u></p> <p><u>Erwachsene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fentanyl fraktioniert 0,5 µg/kg KG i.v. Bolusgaben • Abstand 5 Minuten • bis zu einer Gesamtdosis von maximal 2,5 µg/kg KG i.v. (normalgewichtige Erwachsene ca. 0,05 mg Bolusgaben und maximal 0,2 mg Gesamtdosis) <p><u>Kinder (bis 12 Jahre)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fentanyl fraktioniert 0,5 µg/kg KG i.v. Bolusgaben • Abstand 5 Minuten • bis zu einer Gesamtdosis von maximal 1 µg/kg KG i.v. <p><u>Morphin bei Herzinfarkt beim Erwachsenen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Morphin fraktioniert 1-2 mg i.v. Bolusgaben • Abstand 5 Minuten • bis zu einer Gesamtdosis von maximal 5 mg i.v.
--	---

- Verlaufskontrollen des Schmerzstatus!
- Möglichst telefonischer Kontakt zum Notarzt !

Abkürzungsverzeichnis

NRS	Numerische Rating-Skala
kg KG	Kilogramm Körpergewicht
VAS	Visuelle Analogskala